



การเจาะหนองที่เปลือกตาหรือเจาะกุ้งยิง

ทำได้โดยฉีดยาชาเฉพาะที่ และกรีดลงบนผิวหนังที่เป็นตามรอยผิวหนังขนานกับเปลือกตา หรือกรีดจากด้านในของเปลือกตา ทั้งนี้แล้วแต่ตำแหน่งของกุ้งยิง แล้วใช้ที่ดูดหนองอันเล็กๆ พูดจนหนองหมด

การปฏิบัติตัว หลังเจาะหนองที่เปลือกตา

1. ปิดตาแน่นไว้ 2-3 ชั่วโมง ห้ามเปิดออกก่อนเวลาที่แพทย์หรือพยาบาลแนะนำ เพราะอาจจะทำให้เลือดไหลไม่หยุดได้
2. ห้ามไม่ให้ที่ปิดตาเปียกน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้
3. หลังจากที่ถูกเวลาเปิดตาแล้ว ให้เริ่มหยอดตา หรือป้ายตาตามคำสั่งแพทย์
4. หากตาบวม หรือมีเลือดไหลไม่หยุดหรืออาการผิดปกติควรกลับมาพบแพทย์

หากท่านปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดแล้ว แต่อาการยังไม่ดีขึ้น ควรกลับไปพบจักษุแพทย์ใหม่ เนื่องจากอาจจำเป็นที่จะต้องเพิ่มยา หรือ ให้การรักษาเป็นอย่างอื่น



📍 158 หมู่ 10 ถ.เชียงใหม่-ฮอด
ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

🌐 www.chiangmaiklaimor-hosp.com

📍 โรงพยาบาลเชียงใหม่ไคลมอร์

“เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชน
ในด้านการให้บริการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร”



CHIANGMAI
KLAIMOR HOSPITAL
โรงพยาบาลเชียงใหม่ไคลมอร์

ตากุ้งยิงและ หนองที่เปลือกตา



สอบถามเพิ่มเติม

☎ 053-200-002 ต่อ 12